

ALDO+
TEST®

Primärer Hyperaldosteronismus - Klinische Relevanz und neue diagnostische Ansätze

Hypertonie-
♥ Diagnose mit
Präzision.

ALDO+PA – Präzisionsdiagnostik bei unkontrolliertem Bluthochdruck. Der erste CE-IVD-zertifizierte Bluttest, der Aldosteron und Angiotensin II direkt per Massenspektrometrie misst – zur Detektion von primärem Aldosteronismus und mehr.
Jetzt verfügbar über labors.at



aTENSION.life



Vorträge & Q&A

Präzision in der Hypertonie-Diagnostik

Bei aTENSION setzen wir neue Maßstäbe in der Diagnose und Behandlung von Bluthochdruck. Unser Ziel ist es, modernste Massenspektrometrie für alle zugänglich zu machen, um Patienten eine gezielte Behandlung zu ermöglichen.



Mit unseren Lösungen verbessern wir die Lebensqualität von Bluthochdruckpatienten und öffnen Laboren den Zugang zur Präzisionsdiagnostik.



Hyperaldosteronismus: Viel häufiger als wir denken?

Univ.-Dozent Dr. med. René R. Wenzel

Aldosteron und Angiotensin II als universelle klinische Marker für primären Hyperaldosteronismus und Therapieadhärenz bei unkontrollierter Hypertonie

Dr. Marko Poglitsch

26.06.2025 - 14:15

